

| Ydelse 3015 | Total fjernelse af halsmandler (Tonsillektomi) |
|-----------------------------|--|
| Ny/eksisterende | Eksisterende. |
| Målgruppe/ indikation | Patienter med gentagne halsbetændelser, forstørrede mandler og tonsilpropper samt dårlig ånde, der ikke responderer tilstrækkeligt på konservativ behandling. |
| Undersøgelse/ behandling | I fuld bedøvelse, efter anbringelse af mundspærre med tandbeskytter, fjernes halsmandlerne helt. Det kan være nødvendigt at anlægge tamponade eller el-koagulere efter indgrebet for at standse eller forebygge blødning. Observation for postoperativ blødning. Patient/forældre informeres om forholdsregler ved efterblødning. |
| Særlige forhold | |
| Apparatur | Kirurgiske instrumenter, diatermiudstyr, pandelampe og lyskilde. |
| Uddannelsesbehov | |
| Klinikpersonale | |
| Utensilier | Engangssug, lokalbedøvende medicin, evt. kirurgisk engangsudstyr og tamponer med sikring. |
| Kvalitetssikring | Indgrebet udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende National Klinisk Retningslinje. |
| Patientinformation | Relevant mundtlig og skriftlig information. |